

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

دستور العمل جمع آوری نمونه مدفوع جهت بررسی خون مخفی

در برخی مواقع خونریزی‌های مختصری در بخش‌های مختلف لوله گوارش اتفاق می‌افتد که به علت مقدار کم، با چشم قابل رویت نیست و صرفاً با روش‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص است. این آزمایش در ۳ نوبت انجام می‌گیرد.

نکات مهم

- ◀ از ۴۸ تا ۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع‌آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، شلغم و تربچه خودداری نمایید.
- ◀ می‌بایست مصرف داروهای: آهن، ایندومتاسین، کلشی سین، آسپرین، بروفن، کورتون و ویتامین C از ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش و دوره جمع‌آوری نمونه قطع شود.
- ◀ به دلیل احتمال خونریزی از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان، ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید.
- ◀ نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود.

! برچسب نام و نام خانوادگی، شماره بیمار نوع نمونه روی ظرف جمع‌آوری الصاق گردد.

! در مورد قطع نمودن داروهای تجویز شده قبلاً با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

! لازم است نمونه جمع‌آوری شده (به ویژه در موارد مشکوک به اسهال خونی) بلافاصله به آزمایشگاه ارسال گردد.