

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

### دستور العمل آزمایش پوستی توبرکولین (PPD)

برای آزمایش پوستی توبرکولین مقدار کمی از محلول PPD را درست زیر لایه اول پوست ساعد دست تزریق می‌کنند. این آزمایش برای کمک به تعیین ابتلای بیمار به عفونت نهفته یا فعال با باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس درخواست می‌شود. هنگامی که سلول‌ها در معرض PPD قرار می‌گیرند، واکنش پوستی به شکل خارش و یا التهاب در محل تزریق بروز می‌نماید.

#### نکات مهم

- ◀ از شستشوی محل تزریق آزمایش به مدت ۷۲ ساعت اجتناب نمایید.
- ◀ حضور شخص ۷۲ ساعت بعد از تزریق، برای بررسی نتیجه اندازه‌گیری قرمزی و سفتی محل تزریق الزامی است.
- ◀ زمان آزمایش طوری تنظیم شود که خوانش آن با روزهای تعطیل تلافی پیدا نکند.
- ◀ جهت خوانش بهتر است در مدت تعیین شده به آزمایشگاه مراجعه کنید، در غیر این صورت، می‌توانید به مراکز درمانی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایید و عدد مربوطه را پس از خوانش توسط کارشناس آن مرکز به آزمایشگاه اطلاع دهید.